

TRATAMIENTO EN DISTONÍA



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Permite reducir la tensión muscular, aliviar el dolor muscular, disminuir los espasmos, la agitación y la inestabilidad.

TOXINA BOTULÍNICA

La neurotoxina causa debilidad muscular regional, reduciendo la hiperactividad de los músculos asociada a la distonía. Existe un programa de medicamentos de alto, que cubre el tratamiento con Toxina de 1620 personas con distonía focal de FONASA en 28 hospitales de Chile.



LA REHABILITACIÓN

Es importante asesorarse por un equipo interdisciplinario para que lo acompañen en el proceso de mejorar su calidad de vida, en cuanto a lo motor, psicológico y ocupacional.

En el caso de inyección de toxina, es importante la rehabilitación previa y posterior al procedimiento desde las áreas de kinesiología o fonoaudiología para prolongar sus efectos esperados.



LA CIRUGÍA

Es sugerida para personas con distonía grave, cuando el tratamiento farmacológico e inyecciones de Toxina no han sido efectivas. Esto consiste en la estimulación de un microelectrodo en un sector profundo del cerebro.



LEY RICARTE SOTO

Permite acceder a un sistema de protección financiera universal que garantiza el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alto costo. A fines de 2018, se incorpora el implante del estimulador cerebral profundo para las distonías generalizadas.



!NO ESTAS SOLO; FUNDACIÓN DISTONÍA

ESPACIO QUE BUSCA GENERAR UNA RED DE APOYO Y AUTOAYUDA, ENTRE PERSONAS CON DISTONIA Y LA COMUNIDAD

